



25 CONGRESO
SEFAP • JEREZ
25-27 Mayo 2022

POSOLOGIA FRACCIONADA: ERRORES DE PRESCRIPCIÓN EN FORMAS FARMACÉUTICAS NO FRACCIONABLES



José Ignacio Gutiérrez Revilla

25 años SEFAP

De la calidad terapéutica a la calidad asistencial





INTRODUCCIÓN

FF SÓLIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL:

FF
CÁPSULA BLANDA
CÁPSULA BLANDA GASTRORRESISTENTE
CÁPSULA DURA
CÁPSULA DURA DE LIBERACIÓN MODIFICADA
CÁPSULA DURA DE LIBERACIÓN PROLONGADA
CÁPSULA DURA GASTRORRESISTENTE
CÁPSULA GASTRORRESISTENTE



FF
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO BUCAL
COMPRIMIDO BUCODISPERSABLE
COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN MODIFICADA
COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA
COMPRIMIDO DISPERSABLE
COMPRIMIDO EFERVESCENTE
COMPRIMIDO GASTRORRESISTENTE
COMPRIMIDO MASTICABLE
COMPRIMIDO PARA CHUPAR
COMPRIMIDO RECUBIERTO
COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA
COMPRIMIDO SOLUBLE
COMPRIMIDO SUBLINGUAL



INTRODUCCIÓN

¿CÓMO SE PRESCRIBE?

*Unidad	1.0	COMPRIMIDOS *cada	8	Horas ▼
*Unidad	1.0	COMPRIMIDOS *cada	12	Horas ▼
*Unidad	1.0	COMPRIMIDOS *cada	24	Horas ▼

y si aparece ...

*Unidad	0.5	COMPRIMIDOS *cada	24	Horas ▼
*Unidad	1.5	COMPRIMIDOS *cada	24	Horas ▼
*Unidad	2.5	COMPRIMIDOS *cada	24	Horas ▼



SINTROM



OBJETIVO


Evaluar la prescripción, en regímenes posológicos fraccionados, de formas farmacéuticas no fraccionables (FFNF) para diseñar un sistema de ayuda dirigido a mejorar el uso de medicamentos en las personas mayores de la comunidad.





MATERIAL Y METODOS

Estudio retrospectivo de las prescripciones electrónicas en 5804 residentes en los 68 centros de la CCAA Cantabria durante el año 2021.



RESULTADOS



2680
prescripciones
posología fraccionada


33,6%



901
FFNF




RESULTADOS



No influyó el tamaño del centro
ni el carácter rural/urbano



% DE FF NO FRACCIONABLES PRESCRITAS COMO FRACCIONABLES




- COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
- COMPRIMIDOS LIBERACION RETARDADA
- COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRESISTENTES
- CAPSULAS DURAS
- CAPSULAS BLANDAS





% DE PA IMPLICADOS EN LOS ERRORES DE PRESCRIPCIÓN





CONCLUSIONES

 La decisión de cortar un comprimido o bien abrir una cápsula para seguir un régimen posológico concreto, o facilitar la deglución en personas mayores, no debe ser tomada a la ligera. Hay una serie de medicamentos que por su composición, forma farmacéutica o características no deben ser fraccionados.



CONCLUSIONES



El resultado obtenido en el estudio en residencias no es desdeñable. En el 1,8% de las prescripciones activas en este grupo de población hay un claro error de prescripción por una mala selección de la forma farmacéutica que puede afectar a la seguridad (mala dosificación, incremento de efectos adversos, pérdida de eficacia).



CONCLUSIONES



La incorporación de un aviso en aquellos medicamentos con FFNF en el sistema de receta electrónica ayudará a evitarlo, garantizando la biodisponibilidad óptima del medicamento y la máxima eficacia terapéutica.

**COMPRESOS
RECUBIERTOS CON
PELÍCULA**



*¡Muchas
gracias!*